






Liste de contrôle pour les conseils

Directives pour l'utilisation d'aérosols doseurs



- 1 Agitez l'aérosol doseur et retirez le capuchon.
- 2 Si l'aérosol doseur n'a jamais été utilisé ou s'il n'a pas servi depuis plusieurs jours, amorcez-le en vaporisant un peu de médicament loin de vous à quelques reprises.
- 3 Expirez profondément.
- 4 En tenant l'aérosol doseur à la verticale (la cartouche vers le haut), placez l'embout buccal dans votre bouche (ou tel qu'indiqué) et renversez votre tête légèrement vers l'arrière.
- 5 Tout en appuyant sur l'aérosol doseur, prenez une inspiration lente et profonde par la bouche, afin de libérer une dose de médicament.
- 6 Continuez à inspirer aussi longtemps que possible.
- 7 Retenez votre souffle pendant environ 10 secondes.
- 8 Expirez lentement, loin de l'aérosol doseur.
- 9 Si vous devez inhaler une autre dose du même médicament, attendez environ une minute entre les pulvérisations, puis répétez ensuite les étapes 3 à 8.
- 10 Une fois terminé, remettez le capuchon sur l'aérosol doseur.

 Pour le délai d'attente, consultez les directives.

Pour vivre des jours meilleurs^{MC}

teva

TevaCanada.com